

PREPARACIÓN COLÓNICA CON MANITOL Y BISACODILO TURNO MAÑANA

CÓMO PREPARARSE PARA UNA COLONOSCOPIA | TURNO MAÑANA | DE 8:00 A 12:30 HS.

IMPORTANTE: LEA ESTAS INSTRUCCIONES AL MENOS 3 DÍAS ANTES DE SU TURNO

Para obtener resultados satisfactorios del estudio, su intestino deberá encontrarse vacío para que el médico endoscopista pueda verlo claramente. Para ello debe seguir las instrucciones que siguen exactamente como están escritas.

Como el estudio se realiza con anestesia no podrá manejar por el resto del día y deberá asistir acompañado por un adulto que pueda permanecer en la clínica hasta que el estudio haya finalizado. Usted no podrá manejar ni retirarse de la clínica solo.

MEDICACIONES

En caso de recibir medicación para diabetes, consulte con su médico de cabecera sobre como ajustar estas medicaciones el día previo y el día del estudio. Si usted recibe medicación como aspirina o anti-coagulantes comuníquese con su médico o con HIGEА para definir la conducta a seguir.

TRES (3) DÍAS ANTES DEL ESTUDIO

- No tome medicación antidiarreica, como loperamida (Regulane®, Suprasec®), crema de bismuto, Buscapina®, Sertal®, etc.
- No tome suplementos de fibra (Plantaben®, Motional®, etc.) o alimentos ricos en fibra.

Si usted es constipado (3 o menos deposiciones por semana) tome dos comprimidos de Laxamin® o similar (bisacodilo 5mg) por día, antes de acostarse.

EL DÍA PREVIO A LA COLONOSCOPIA

Durante todo el día podrá ingerir libremente líquidos claros (té, café, mate, aguas saborizadas, caldo colado, helados de agua y gelatina que no sean de color rojo).

La única comida sólida permitida será carne roja o blanca a la plancha, fideos, arroz, huevo en el almuerzo, sin acompañamiento de vegetales. Mediatarde y cena sólo podrán incluir líquidos claros, nada sólido.

Tome cuatro comprimidos de Laxamin o Dulcolax (Bisacodilo 5mg) con un vaso de agua a las 18:00hs del día previo al examen. A partir de este momento sólo podrá tomar líquidos claros, libremente.

¿CUÁNDO TOMAR EL MANITOL?

El envase de manitol RIGECIN® tiene 500cc y debe abrirlo y colocarlo en un envase vacío de un litro. Luego agregarle 200cc de agua fría y mezclarlo. El resultado final es una solución de manitol de 700cc.

Seis (6) horas antes del horario en que debe presentarse en la clínica, comience a tomar un vaso cada 15 minutos hasta terminarlo. **Es fundamental que TOME TODO EL ENVASE para que la preparación sea adecuada. Al finalizar el envase, debe intentar tomar un litro de agua extra.**

RECUERDE QUE DEBE CONCURRIR A LA CLINICA AL HORARIO ASIGNADO SIN HABER INGERIDO NADA (SÓLIDO NI LÍQUIDO) EN LAS 4 HORAS PREVIAS Y NADA SÓLIDO EN LAS 4 hs. PREVIAS.

TURNO | DÍA:

HORARIO:

CONCURRIR CON CARNET DE SU OBRA SOCIAL / ÓRDENES AUTORIZADAS, DNI, ELECTROCARDIOGRAMA (O ÚLTIMO CONTROL CARDIOLÓGICO) Y PEDIDO MÉDICO DEL ESTUDIO.

TEL: 4236938 / 4237293 / 153445867 – info@higea.com.ar | 9 DE JULIO 2221, CIUDAD | www.higea.com.ar